

Dr Guillaume BON

Ancien interne, Université de Montréal

Dr Nerea ECHEBERRIA

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

Dr Jean-Michel CASAMATTA

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Mathieu LENORMAND

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

Dr Marianne DEPECKER

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

Dr Fabien RELAVE

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

CHOUPA

N° Puce : 276020000100447

N° SIRE : 50446505R

Age : 14 ans / Poids : 574 kg

Espèce : Cheval

Race : Westfalen Riding Horse

Sexe : F

Non destiné à la production alimentaire

MLLE NATUREL Oceane

2 impasse des puits

Chez Boutrit

17520 STE LHEURINE

Dr Marianne DEPECKER

DIPL.ECEIM

mdepecker@cliniquedeconques.com

N° national d'inscription : 21391

ordonnance n°24-04-0683[C]

le 26/04/2024

1 - IPRATROPIUM 0.5mg BT 10 DOSES

Non délivré à ce jour **Qté : 1**

Substance(s) active(s) : N/A

Forme pharmaceutique : N/A

Posologie : Administrer par nébulisation 2 ampoules matin et soir pendant 1 semaine

Délai d'attente : Délai dopage 10 jours Substance essentielle,

renouvellement interdit

2 - BUDESONIDE 1MG/2ML BT 20 UNIDOSES

Non délivré à ce jour **Qté : 1**

Substance(s) active(s) : N/A

Forme pharmaceutique : N/A

Posologie : Administrer par nébulisation: une ampoule matin et soir pendant 7 jours, puis une ampoule une fois par jour pendant 6 jours

Délai d'attente : Délai dopage 8 jours

renouvellement interdit

- Echauffer la jument la tête en extension / libre pour limiter les felxions de la tête
- Essayer plusieurs embouchures et muserolles lors du travail à la maison pour trouver celui/celle qui permettra à la jument de décontracter et libérer sa langue. Une muserolle australienne peut être essayée.
- Des exercices de revalidation de la gorge sont nécessaires pour renforcer les muscles et améliorer la stabilité à l'exercice :
- Tractions de la langue : au repos, prendre la langue en main et la tirer délicatement lorsque le cheval résiste : à gauche 10 fois puis à droite 10 fois, à répéter 2 fois par jour. Si le cheval ne supporte pas qu'on joue avec sa langue, une alternative est de mettre du miel épais sur la lèvre supérieure pour favoriser les mouvements de la langue vers l'avant.
- Mettre les aliments à des hauteurs différentes : soit au sol dans un seau, soit dans la mangeoire.
- Mettre des grosses pierres dans la mangeoire pour stimuler le travail de la langue.
- Mettre le foin dans un sac à foin ou un filet double, changer la hauteur régulièrement sur la semaine.
- Donner 30 ml de San Api (à vous procurer sur le site www.sanequine.be) dans la bouche avant le travail.
- Litière: retirer les tapis en caoutchouc et nettoyer la litière pour limiter les fortes oderus d'urine (aggravent les inflammations pulmonaires)
- Limiter les courants d'air dans le box / la mettre dans un pré plus bas

Cette prescription concerne le cheval désigné et ne doit en aucun cas être appliqué à un autre.

Les délais d'attente et de dopage indiqués sont approximatifs. Seule une analyse de dépistage peut permettre de vérifier l'absence effective de trace.

Le cheval a potentiellement reçu des substances l'excluant temporairement ou définitivement de la consommation humaine. Le cas échéant nous contacter pour plus d'informations.